

Informacija za roditelje i skrbnike

Danas su u Austriji **ospice sve učestalije**, jer se djeca u Austriji protiv ospica cijepe **prekasno i nedovoljno dosljedno s 2 cjepiva**: Kod djece starosti od 2 do 5 godina rata pokrivenosti cijepjenja iznosi samo 92 %, uz to je 10 % njih cijepjeno samo jednom umjesto dvaput. Međutim, kako bi se postigao dovoljan skupni imunitet, nužne su rate pokrivenosti cijepjenja od 95 % s dvije doze živog cjepiva protiv ospica. Sve dok u stanovništvu postoje propusti u cijepjenju, odnosno dok se premalo osoba štiti od ospica, moramo i dalje računati s oboljenjima od ospica.

Ospice su **visoko zarazne** i prenose se kapljicama (govorenje, kašalj, kihanje itd.). Mogu se razboljeti dojenčad, djeca, ali i mladi i odrasli koji su nezaštićeni. Odgovarajuća zaštita postoji nakon 2 pismeno dokumentirana cijepjenja živim cjepivom ili nakon nalaza zaštitnih razina protutijela u krvi (određivanje titra).

Kod ospica u roku od osam do deset dana (najviše 21 dan) nakon zaraze dolazi do općih poteškoća poput vrućice, hunjavice, kašlja i konjunktivitisa, koje prati osip tipičan za ospice: crvene mrlje hrapave površine. Pritom su oboljeli četiri do osam dana nakon pojave osipa visoko zarazni. **Otpornost tijela** tijekom i nakon oboljenja od ospica toliko je **oslabljena**, da je još godinama kasnije povišen rizik od smrti uzrokovan drugim zaraznim bolestima! Ne postoji liječenje same infekcije virusa ospica, samo se simptomi mogu ublažiti.

U 20 od 100 slučajeva ospica pojavljuju se **komplikacije poput bronhitisa, upale srednjeg uha i/ili upale pluća**. Kod 1-2 osobe od 1000 oboljelih dolazi do **meningitisa** opasnog po život. Rijetko može godinama kasnije doći do propadanja mozga, koje je uvijek smrtonosno. Ova se kasna posljedica zove subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE). U posebnoj opasnosti od SSPE-a su djeca koja obole u prvoj životnoj godini ili se zaraze prilikom rođenja.

Pravovremenim cijepljenjem možete zaštititi sebe, svoju obitelj i okolinu! Preporučuju se **2 cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole s razmakom od 4 tjedna nakon navršenog 9. mjeseca života**. Propuštena cijepjenja mogu se i trebaju nadoknaditi što je prije moguće. Djelotvorno, dobro podnošljivo cjepivo dostupno je **besplatno i bez dobnog ograničenja za sve osobe u javnim ambulanzama za cijepjenje**.

Važno

Ako Vaše dijete nije odgovarajuće cijepjeno protiv ospica, u slučaju kontakta s osobom oboljelom od ospica, Ured za zdravstvo može ga do 21 dana isključiti iz društvenih ustanova poput vrtića, škole, jaslica itd.

(usp. §§ 6 ff. Zakona o epidemijama)

Daljnje informacije:

- www.keinemasern.at
- Javna savjetovališta i ambulante za cijepjenje pokrajina:
www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/impfen
- Raspored cijepjenja za Austriju 2017: www.bmgf.gv.at/home/Impfplan