

Vaccinați-vă acum împotriva rujeolei

schützt
einfach.

Protejați-vă pe dumneavoastră și
pe cei din jur de rujeolă, oreion și
rubeolă.

Detalii pe pagina impfen.gv.at/masern

Ce este rujeola (pojarul)?

Rujeola, denumită și pojar, nu este o boală inofensivă a copilăriei, ci o **afecțiune virală foarte contagioasă**. Virusul rujeolei poate infecta orice persoană lipsită de imunitate: sugari, copii, adolescenți și adulți.

Rujeola poate provoca **complicații grave** precum și **afecțiuni secundare**.

Simptomele posibile ale rujeolei includ:

- Febră mare
- Erupecie pe piele (pete roșii, plate)
- Conjunctivită

Cum ne putem infecta?

Virusurile rujeolei se transmit prin picături respiratorii (vorbire, tuse, strănut). Perioada de contagiozitate începe deja cu 4 zile înainte de apariția erupției pe piele.

- În cazul a aproximativ **1 din 5 bolnavi** au loc evoluții severe cu bronșită, inflamații ale urechii medii și/sau pneumonie.
- În aproximativ **1-2 din 1.000 de cazuri** se poate ajunge la encefalită (inflamare a creierului), o complicație care pune viața în pericol.
- Aproximativ **1 din 600 de copii care contractează boala** la o vârstă mai mică de 1 an dezvoltă o formă rară de encefalită (PESS, panencefalită sclerozantă subacută). Această sechelă tardivă a rujeolei cauzează întotdeauna moartea.



Cum ne putem proteja împotriva rujeolei (pojarului)?

- **Vaccinul combinat împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR)** oferă protecție de lungă durată împotriva evoluțiilor severe și a sechelelor.
- Se recomandă administrarea a **2 doze de vaccin** începând cu vârsta de **9 luni**. În orice caz, copiii trebuie vaccinați înainte de a intra în colectiv (creșă, grădiniță).
- Vaccinarea pentru **toate categoriile de vârstă** în centrele publice de vaccinare este **gratuită**. Vaccinul este foarte eficient și de regulă este foarte bine tolerat.

- **Verificați-vă statusul de vaccinare!**
- După două vaccinări ROR confirmate în scris, dovada unei concentrații suficiente de anticorpi de protecție în sânge sau după o infecție cu virus rujeolic confirmată prin teste de laborator, se poate presupune că nivelul de protecție este suficient.
- Vaccinările neefectuate la timp pot și ar trebui **recuperate cat mai curând posibil, la orice vârstă**.
- Autoritățile sanitare pot interzice oricărei persoane care nu poate face dovada că dispune de imunitatea necesară împotriva rujeolei accesul în instituțiile publice și comunitare precum grădiniță, școală, after-school etc. pe o perioadă de până la 21 de zile, în cazul în care a intrat în contact cu un bolnav de rujeolă.

Iată ceva ce mulți nu știu:

Rujeola (pojarul) slăbește capacitatea de apărare a organismului într-o asemenea măsură încât timp de câțiva ani poate exista un risc crescut de apariție a altor boli infecțioase care pun viața în pericol.



Întrebați-vă medicul sau farmacistul cu privire la vaccinurile recomandate. Informații cu privire la vaccinarea ROR gratuită găsiți pe pagina impfen.gv.at/masern.



Informațiile complete, recomandările de imunizare și ofertele de vaccinare sunt disponibile pe pagina impfen.gv.at.

CASETA TEHNICĂ:

Proprietar media și editor: Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Îngrijirii și Protecției Consumatorului (BMSGPK), Stubenring 1, A-1010 Viena, +43 1 711 00-0 Tipar: BMSGPK, Stubenring 1, A-1010 Viena Locul apariției și publicării: Viena Versiunea: februarie 2024. Sub rezerva eventualelor greșeli de tipar, tehnice sau de altă natură. Toate drepturile rezervate.