

**Vaccinarea împotriva
coronavirusului:
Când mă vaccinez din nou?
(„al 3-lea vaccin”)
Vaccinarea este eficientă!**



Protejați-vă!

Prin decizia de a vă vaccina împotriva coronavirusului, contribuiți substanțial la protecția propriei sănătăți și a semenilor dumneavoastră.

Vaccinați-vă conform recomandărilor pentru a rămâne protejat.

- **Protecția oferită de vaccin scade cu timpul** – scăderea este mai rapidă în cazul persoanelor mai înaintate în vârstă sau care suferă de boli preexistente.
- Tuturor persoanelor deja vaccinate li se recomandă **vaccinarea** suplimentară cu un **vaccin de tip ARNm**.
- Mai ales în sezonul rece, numărul de îmbolnăviri de COVID-19 crește. **Riscul de apariție a unor variante noi de virus se mărește.**
- Vaccinul împotriva coronavirusului asigură o protecție eficientă. Discutați cu alții despre experiențele dumneavoastră și însoțiți-i la vaccinare!

Important de știut:

Datele din alte țări arată că infecțiile, infectarea vaccinaților și perioadele de spitalizare rezultate de aici pot fi reduse semnificativ prin administrarea celei de-a 3-a doze de vaccin, conform recomandărilor.

oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

Vaccinați-vă din nou!

- Persoanelor care s-au vaccinat **prima oară cu COVID-19 Vaccine Janssen („Johnson&Johnson”)** li se recomandă **administrarea unei doze suplimentare începând cu 4 săptămâni** de la prima vaccinare.
- Pentru toate **persoanele care au împlinit 18 ani, vaccinarea cu a 3-a doză** se poate face **începând cu 4 luni**, respectiv trebuie să fie efectuată **începând cu 6 luni de la administrarea celei de-a 2-a doze**. Cea de-a treia doză este extrem de importantă pentru persoanele **vârstnice**, precum și pentru persoanele cu **afecțiuni preexistente** sau cu **risc de infectare** crescut.
- În cazul **vaccinurilor cu vector viral** (Vaxzevria de la AstraZeneca și COVID-19 Vaccine Janssen), se recomandă administrarea celei **de-a 3-a doze la 4 luni după cea de-a 2-a doză**, - în cazul **vaccinurilor ARNm se poate face de asemenea inocularea de rapel**.
- Administrarea unor **doze suplimentare de vaccin se recomandă și celor care au trecut prin boală**. Discutați cu medicul dumneavoastră!

Important de știut:

Recomandările de vaccinare sunt adaptate permanent la constatările științifice și se pot modifica. Informați-vă la medicul dumneavoastră cu privire la recomandările actuale și la statusul dumneavoastră vaccinal!

Respectați recomandările!

Comitetul Național pentru Vaccinare (NIG) recomandă tuturor persoanelor începând cu vârsta de 18 ani vaccinarea cu o doză suplimentară de vaccin de tip ARNm. Inocularea se poate efectua începând cu 4 luni și este indicat să aibă loc după 6 luni de la ultima vaccinare.

- Este preferabil ca la a 3-a doză să se administreze același vaccin ca la primele două inoculări:
Comirnaty de la BioNTech/Pfizer sau Spikevax de la Moderna (Moderna începând cu vârsta de 30 de ani).
- Persoanele cărora li s-a administrat **vaccin cu vector viral** trebuie să primească la **a 3-a doză un vaccin ARNm**. Acest lucru este valabil și pentru **vaccinările încrucișate** (cu vaccinuri diferite).
- Pentru persoanele **vaccinate și trecute prin boală** sunt valabile recomandări diferite. Discutați cu medicul dumneavoastră!

Important de știut:

Multă lume beneficiază astfel de cea mai bună protecție pentru a reduce riscul de a face o formă gravă de COVID-19. Este posibilă și utilizarea off-label (vaccinarea fără o indicație aprobată). Premisa o reprezintă o bună informare și documentare prin intermediul medicului dumneavoastră.

Zero șanse pentru știrile false!


Cu siguranță v-au ajuns deja la urechi multe zvonuri despre vaccinul împotriva coronavirusului. Nu le permiteți să vă tulbure. Informați-vă și lămuriți-i și pe alții!

- **Vaccinul împotriva coronavirusului funcționează.** Riscul de a face o formă gravă a bolii sau de a muri este **reduc în mod semnificativ**. Dacă, în cazuri excepționale, îmbolnăvirea de COVID-19 survine totuși în pofida vaccinării, aceasta are în mod normal o evoluție **considerabil mai ușoară**.
- **Coronavirusul provoacă forme de îmbolnăvire periculoase, vaccinarea asigură protecție.** Este un fapt dovedit că numărul celor nevaccinați care au nevoie de spitalizare ca urmare a îmbolnăvirii de COVID-19 este mult mai mare decât al celor care necesită tratament în urma complicațiilor de la vaccin.
- **Vaccinându-vă împotriva coronavirusului, vă protejați pe dumneavoastră și pe toți cei care vă sunt apropo.**

Important de știut:

Multe persoane suferă de efectele pe termen lung ale COVID-19. Vaccinarea protejează împotriva COVID-19 și a posibilelor sale efecte pe termen lung.

Cu cât numărul celor care se îmbolnăvesc de COVID-19 este mai mic, cu atât scade solicitarea asupra sistemului nostru de sănătate. Fiecare vaccinare contează!

 **Bundesministerium**
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Vaccinați-vă acum!

Informați-vă în detaliu cu privire la
vaccinare la medicul sau la farmacistul dum-
neavoastră. Înregistrare la:

oesterreich-impft.at/jetzt-impfen



Informații suplimentare sunt disponibile la
adresa
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung



Caseta tehnică

Proprietar media și editor:

Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății,
Îngrijirii și Protecției Consumatorilor (BMSGPK)

Stubenring 1, 1010 Viena

+43 1 711 00-0

Locul apariției și al producției: Viena

Imaginea de titlu: © Initiative Österreich impft.

Design și tipar: BMSGPK

Versiunea: Noiembrie 2021

Sub rezerva eventualelor greșeli de tipar și erori de altă
natură.

Toate drepturile rezervate.

sozialministerium.at